PATIËNTENBROCHURE VOOR PATIËNTEN DIE WORDEN BEHANDELD MET RITUXIMAB

Versie augustus 2020

Let op bij gebruik van rituximab. Rituximab is het werkzaam bestanddeel in het medicijn. Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam dragen. Kijk dus goed over welk medicijn het gaat.

Deze brochure bevat belangrijke veiligheidsinformatie betreffende rituximab voor patiënten die worden behandeld met rituximab voor andere aandoeningen dan kanker.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over mogelijke bijwerkingen van rituximab.

Over deze brochure

De informatie in deze brochure is voor patiënten die rituximab krijgen voor reumatoïde artritis, granulomatose met polyangiitis of microscopische polyangiitis en pemphigus vulgaris. Lees deze informatie zorgvuldig door - het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de voordelen en risico's van rituximab.

Het gebruik van rituximab verhoogt het risico op infecties en de ernstige herseninfectie progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML). Dit vereist alertheid en controle op verschijnselen van infectie.

- Neem vóór de behandeling met rituximab contact op met uw arts als u geneesmiddelen gebruikt die uw afweersysteem onderdrukken of als u vaccinaties heeft gehad of gepland heeft.
- Neem vóór, tijdens of na de behandeling met rituximab contact op met uw arts als u verschijnselen heeft van een infectie:
  - verhoging (koorts) met of zonder rillingen;
  - aanhoudende hoest;
  - gewichtsverlies;
  - pijn zonder dat u zich heeft verwond;
  - zich algeheel niet lekker voelen, vermoeidheid of weinig energie hebben;
  - brandende pijn bij het plassen.
- Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende verschijnselen van PML krijgt:
  - verwardheid, geheugenverlies of moeite met nadenken;
  - evenwichtsverlies of een verandering in de manier waarop u loopt of praat;
  - krachtsvermindering of verzwakking van één kant van uw lichaam;
  - wazig zien of verlies van het gezichtsvermogen.
- Laat de patiëntenwaarschuwingskaart aan uw arts, mantelzorger en familie zien.
- Houd de patiëntenwaarschuwingskaart altijd bij u. U kunt deze bewaren in uw portemonnee of handtas.

WAT U MOET WETEN OVER RITUXIMAB

Over rituximab

Rituximab beïnvloedt het afweersysteem; het kan u vatbaarder maken voor infecties. Sommige infecties kunnen ernstig zijn en behandeling vereisen.

Rituximab toegediend krijgen

Rituximab wordt toegediend via een infuus in een ader.
Zoals elk geneesmiddel kan ook rituximab bijwerkingen hebben. Als u last krijgt van bijwerkingen, let dan op het volgende:

- Als u rituximab in combinatie met andere geneesmiddelen krijgt, vraag dan aan uw arts of apotheker of de bijwerkingen hierdoor mogelijk versterkt kunnen worden.
- Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en behandeling vereisen. Zelden kunnen sommige bijwerkingen levensbedreigend zijn.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Heeft u nog andere vragen over rituximab of de mogelijke bijwerkingen van dit middel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zorg dat u altijd een lijst bij u heeft met alle andere geneesmiddelen die u gebruikt. U moet deze lijst laten zien aan iedereen die u medische zorg verleent, zoals een arts, apotheker, verpleegkundige of tandarts.

VÓÓR DE BEHANDELING MET RITUXIMAB

Infecties

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige vóór uw behandeling met rituximab als u:

- momenteel een infectie heeft (zelfs als het een lichte infectie is zoals een verkoudheid). Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u vertellen dat u moet wachten tot de infectie voorbij is voordat u rituximab krijgt;
- veel infecties heeft of in het verleden veel heeft gehad;
- een ernstige infectie heeft of heeft gehad, zoals tuberculose, bloedvergiftiging (sepsis) of een andere aandoening die het afweersysteem verzwakt;
- een aandoening heeft waardoor het waarschijnlijker is dat u een ernstige infectie krijgt die behandeling vereist.

Andere aandoeningen

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige vóór uw behandeling met rituximab als u:

- een hartaandoening heeft;
- ademhalingsproblemen heeft;
- zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft;
- virale hepatitis of een andere leveraandoening heeft of heeft gehad;

Geneesmiddelen

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige vóór uw behandeling met rituximab als u:

- geneesmiddelen gebruikt voor een hoge bloeddruk;
- geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op uw afweersysteem; hieronder vallen onder andere geneesmiddelen die uw afweersysteem onderdrukken, genaamd immunosuppressiva of een bepaalde kankerbehandeling (chemotherapie);
- chemotherapie heeft gehad die schade kan aanbrengen aan uw hart (cardiotoxische chemotherapie);
- andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Hieronder vallen onder andere geneesmiddelen die zijn gekocht in een apotheek, drogist, supermarkt of gezondheidswinkel.

Vaccinaties

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige vóór uw behandeling met rituximab als u:

- denkt dat u binnenkort een vaccinatie nodig heeft, waaronder vaccinaties die nodig zijn voor het reizen naar bepaalde landen.

Sommige vaccins mogen niet gelijktijdig met rituximab toegediend worden of in de maanden nadat u rituximab toegediend heeft gekregen. Uw arts controleert of u vaccinaties nodig heeft voordat u rituximab voorgeschreven krijgt. Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige als één van bovenstaande situaties op u van toepassing is. Twijfelt u hierover? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u rituximab gebruikt.

TIJDENS OF NA BEHANDELING MET RITUXIMAB

Rituximab beïnvloedt het afweersysteem en kan ervoor zorgen dat u makkelijker infecties krijgt. Sommige infecties kunnen ernstig zijn en behandeling vereisen.

Infecties

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u één van de volgende tekenen van een mogelijke infectie krijgt:

- verhoging (koorts) met of zonder koude rillingen;
- aanhoudende hoest;
- gewichtsverlies;
- pijn zonder dat u zich heeft verwond;
- zich algeheel niet lekker voelen of vermoeid/futloos voelen;
- brandend gevoel bij het plassen.

Ernstige herseninfectie – genaamd progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML)

In zeldzame gevallen kan rituximab een ernstige herseninfectie veroorzaken met name: progressieve multifocale leuko-encefalopathie of PML. PML kan leiden tot zeer ernstige invaliditeit en kan levensbedreigend zijn.
PML wordt veroorzaakt door een virus. Bij de meeste gezonde volwassenen blijft het virus inactief en is het daardoor ongevaarlijk. Het is niet bekend waarom het virus bij sommige mensen actief wordt, maar het kan verband houden met een verzwakt afweersysteem.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u één van de volgende verschijnselen van PML krijgt:

- verwardheid, geheugenverlies of problemen met nadenken;
- evenwichtsverlies of een verandering in de manier waarop u loopt of praat;
- krachtsverlies of verzwakking aan één kant van het lichaam;
- wazig zien of verlies van gezichtsvermogen.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u één van de bovenstaande verschijnselen van PML krijgt tijdens de behandeling of tot 2 jaar na de laatste dosis rituximab.

PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART

De patiëntenwaarschuwingskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waar u van op de hoogte moet zijn vóór, tijdens en na een behandeling met rituximab.

- Uw arts, apotheker of verpleegkundige moet u iedere keer dat u een rituximab-infusie krijgt, een patiëntenwaarschuwingskaart geven.
- Houd de patiëntenwaarschuwingskaart altijd bij u. U kunt deze bewaren in uw portemonnee of handtas.
- Laat de patiëntenwaarschuwingskaart zien aan elke arts, verpleegkundige of tandarts die u bezoekt - niet alleen aan de specialist die u rituximab voorschrijft.
- Vertel uw partner of mantelzorger over uw behandeling en laat hem/haar de patiëntenwaarschuwingskaart lezen, omdat hij/zij mogelijk bijwerkingen kan opmerken waar u zich niet bewust van bent.
- Houd de patiëntenwaarschuwingskaart bij u tot 2 jaar na de laatste dosis rituximab. Dit is belangrijk omdat de bijwerkingen van rituximab op het afweersysteem zich maanden later kunnen ontwikkelen. Er kunnen zich dus zelfs nog bijwerkingen voordoen terwijl u niet langer wordt behandeld met rituximab.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.
Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op
https://www.pfizer.nl/product/rituximab/armm.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.
Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

PP-RIT-CBG-01/2020