

PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART
SPECIFIEK VOOR ZWANGERSCHAP

VELSIPITY® (etrasimod) ▼

VELSIPITY® (etrasimod) ▼

Patiëntenwaarschuwingskaart specifiek voor zwangerschap

Versie:

Datum van goedkeuring:

Informatie voor de patiënt

Bij gebruik tijdens de zwangerschap kan etrasimod schadelijk zijn voor de ongeboren baby. Mogelijke risico's zijn onder andere verlies van de ongeboren baby en aangeboren afwijkingen.

- Gebruik etrasimod niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft, of als u zwanger kunt worden en geen effectieve anticonceptie gebruikt.

- Voor de start van de behandeling met etrasimod:
 1. Uw arts zal u uitleggen wat de mogelijke risico's voor een ongeborn baby zijn als u zwanger wordt tijdens het gebruik van etrasimod en u regelmatig vertellen hoe u de risico's zoveel mogelijk kunt beperken.
 2. U moet effectieve anticonceptie gebruiken terwijl u etrasimod gebruikt en tot 14 dagen nadat u met etrasimod bent gestopt.
 3. Uw arts zal een zwangerschapstest uitvoeren en deze moet negatief zijn. Tijdens de behandeling zullen ook zwangerschapstesten worden uitgevoerd.

- Vertel het uw arts onmiddellijk als u zwanger wordt tijdens de behandeling met etrasimod of binnen 14 dagen nadat u met etrasimod bent gestopt. Uw arts zal het risico op schadelijke effecten voor de baby als gevolg van de behandeling met u bespreken en kan verder onderzoek regelen, zoals een echo. Etrasimod moet worden gestopt tijdens zwangerschap.
- Vertel het uw arts onmiddellijk als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt zwanger te zijn, of zwanger wilt worden.

- Draag deze kaart bij u en laat hem zien aan elke arts of apotheker die bij uw zorg betrokken is.
- Zie de bijsluiter van etrasimod voor meer informatie.

Overige informatie (graag invullen)

Naam patiënt: _____

Naam arts: _____

Tel. arts: _____

Fax arts: _____